

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 25 novembre 1914.

Présidence de M. Ch. ALLUAUD.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — MM. le D^r JEANNEL, le D^r M. ROYER et le D^r P. ACHERAY, tous les trois en bonne santé, dans des ambulances du front, se rappellent au souvenir de leurs confrères.

Distinction honorifique. — Notre collègue M. J. DE MUIZON, sous-lieutenant de réserve au 79^e régiment d'infanterie, âgé de 23 ans, actuellement en traitement dans un hôpital de Rennes et dont nous avons annoncé la blessure dans un *Bulletin* précédent, vient d'être nommé Chevalier de la Légion d'honneur, après une citation à l'ordre de l'armée, pour sa brillante conduite sur le champ de bataille.

Nécrologie. — Le Président a le très vif regret d'annoncer la mort de LÉON CARPENTIER, membre de notre Société depuis 1893, décédé à Amiens (Somme) le 18 novembre 1914, à l'âge de 76 ans.

L. CARPENTIER, qui s'occupait surtout d'Hyménoptères et de Coléoptères, a laissé une œuvre capitale, la 2^e édition du Catalogue des Coléoptères de la Somme (1908), qui est d'une perfection rare et peut être citée comme un modèle de ce genre de travaux.

Changement d'adresse. — M. Enrico RAGUSA, via Alessio Narbone, 10, 1^o p., à Palerme (Sicile).

Communications.

Descriptions de plusieurs espèces d'Arachnides récemment découvertes en France

par E. SIMON.

Lophocarenum Susannae, n. sp. — ♂. Céphalothorax brunâtre pourvu d'un gros lobe céphalique, vu en dessus aussi long que large

Bull. Soc. ent. Fr., 1914.

N^o 18

et très largement tronqué en avant, laissant voir le bord frontal. Scutum abdominal noir, fortement et densément ponctué. Tibia de la patte-mâchoire armé de deux apophyses : une apophyse supère très longue, relevée mais fortement arquée en avant, robuste mais longuement atténuée, un peu déprimée en dessus et obtuse, et une apophyse externe plus courte, perpendiculaire, robuste, atténuée, terminée en petit crochet aigu, recourbé en avant. Tarse armé en dessus, à la base, d'une longue apophyse dressée, verticale, épaisse à la base, ensuite grêle et droite, mais un peu courbée en avant à la pointe. Long. 2 mm.

Rhône : St-Germain-au-Mont d'Or (C^{te} de DALMAS).

Cette espèce se distingue de toute les autres par l'apophyse dressée du tarse, à part cela elle ressemble un peu au *L. nemorale*.

Cnephlocotes nesiotés, n. sp. — ♂. Assez voisin des *C. silus* Cambr. (= *Cn. pusillus* E. S., non Mengé) et *crassirostris* E. S., il en diffère par le tibia de la patte-mâchoire vu en dessus assez étroit et au moins aussi long que large, un peu avancé, non atténué et tronqué droit à l'extrémité avec l'angle externe finement bordé de noir ; son apophyse externe cachée en dessus, vue de profil dirigée en bas assez étroite et obtuse, par son tarse déprimé et fovéolé sur la face postérieure verticale, enfin par ses yeux postérieurs en ligne plus récurvée. Long. 1 1/2 mm. — Corse!

Sans localité précise ; un mâle mêlé à mes *C. silus* de Corse, provenant de Corbara ou de Calvi.

Wideria Dalmasi, n. sp. — ♂. Céphalothorax noir olivâtre, pourvu d'un lobe céphalique très reculé, cylindrique, très incliné et détaché du plan frontal en avant, et d'une pointe frontale plus longue que le lobe, grêle mais un peu dilatée en massue à l'extrémité, obliquement tronquée et bordée de chaque côté d'une série de forts crins dressés et recourbés. Apophyse supéro-interne du tibia, vue en dessus, simple, non divisée, large mais très comprimée et tranchante en dessus avec le bord externe pourvu de 1 ou de 2 très petits denticules, très acuminée en pointe aiguë un peu recourbée. Abdomen noirâtre. Pattes blanc jaunâtre. — Long. 2 mm.

H^{tes}-Pyrénées : Gabas (C^{te} de DALMAS).

Wideria languida, n. sp. — ♂. Voisin de *W. cucullata* C. K., en diffère par le lobe céphalique vu en dessus, ovale plus court, atténué, conique, obtus en avant, ses yeux plus gros, leur intervalle non double de leur diamètre, son apophyse tibiale supéro-interne simple, non

divisée, très atténuée mais très légèrement dilatée à l'extrémité en petite palette un peu relevée, armée sur ses bords d'épines inégales divergentes dont l'apicale souvent bacilliforme et obtuse. Long. 1,5 à 1.8 mm.

Bouches-du Rhône : les Alpes. Vaucluse : mont Luberon (nov. 1913!).

Sur divers *Chauliognathus* Hentz [COL. MALACODERMIDAE]

par Maurice Pic.

Chauliognathus sodalis Wat. — Cette espèce est variable. La forme type a les élytres entièrement testacés, mais ces organes sont tantôt testacés avec une large macule apicale noire (var. **Chevrolati**, n. var.), tantôt testacés à macule apicale noire avec une deuxième macule noire plus ou moins étendue autour de l'écusson (var. **praescutellaris**, n. var.). La forme type et les deux variétés sont originaires du Mexique : Durango (coll. Pic).

Chauliognathus tripartitus Chev., n. var. **Waterhousei**, Bourg. in litt. — *Elytris testaceis, ad basin late nigra notatis*. — Costa Rica (P. BOLLÉY in coll. Pic).

Cette variété se distingue de *C. tripartitus* Chev. et des variétés déjà décrites par la coloration élytrale en majeure partie testacée.

Chauliognathus limbatithorax Pic, var. **sublimbatus**, n. var. — *Thorace nigro, minute testaceo notato, elytris nigris, ad medium testaceo maculatis, lateraliter postice apiceque testaceo limbatis*. — Bolivie (coll. Pic).

Très distinct de la forme type par la coloration en majeure partie foncée du prothorax et les dessins testacés des élytres.

Chauliognathus signatus Gorb. — On doit inscrire comme variété du *C. signatus* Gorb. (1) la *C. nigrocinctus* Gorb. A la même espèce doit être rapporté comme nouvelle variété, sous le nom de **nigrobasalis**, n. var., un exemplaire mexicain de ma collection dont les

(1) Le nom de *signatus* Gorb. doit prévaloir sur celui de *nigrocinctus* Gorb. qui le suit (Biol. Centr. Am. III, 2, p. 72), pour obéir aux lois de la priorité.